



**Dumarami ang
nagkakasakit sa puso.
Ito ang pangunahing
sanhi ng pagkamatay
ng mga kababaihan sa
buong mundo.**



**Hindi napapansin ang
mga sintomas ng atake
sa puso sa mahigit 50%
ng mga kababaihan.**

**Mga sintomas ng atake sa puso na madalas na
maramdaman ng mga kababaihan:**

- Pananakit, paninikip o pamimigat ng dibdib
- Pananakit ng panga, leeg, kanang braso, o likod
- Labis na pagpapawis
- Kakapusan ng hininga
- Pananakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, o impatso

**Iba pang mga sintomas na maaaring maramdaman
ng mga kababaihan:**

- Matinding pagkapagod
- Hirap sa pagtulog
- Pagkahilo o pagkalula
- Mabilis o iregular na tibok ng puso

Ang mga babae ay mas
malamang na magkaroon ng
3 o higit pang mga sintomas
bilang karagdagan sa
pananakit ng dibdib.



Kung sa iyong palagay ay
inaatake ka sa puso, humingi
kaagad ng tulong.
**Kung posible, tumawag sa 911.
Huwag ipagmaneho ang sarili.**

**Maaaring iba ang mga
tipo ng sakit sa puso
sa mga babae kaysa sa
mga lalaki.**

Mga karaniwang tipo ng sakit sa puso:

- Pagbuo ng kolesterol sa mga daluyan ng dugo ng puso (sakit sa coronary artery)
- Tumatagas o naninigas ang mga valve ng puso na nakakaapekto sa pagdaloy ng dugo (sakit sa valve ng puso)
- Iregular o mabilis na pagtibok ng puso (arrhythmia)

**Ang mga babae ay mas malamang na magkaroon
ng:**

- Punit sa malalaking daluyan ng dugo ng puso (spontaneous coronary artery dissection, SCAD)
- Pagsikip ng malalaking daluyan ng dugo ng puso, na nililimitahan ang pagdaloy ng dugo (coronary vasospasm)
- Sakit sa maliliit na daluyan ng dugo (microvascular dysfunction)
- Mahinang puso dahil sa isang nakaka-stress na pangyayari (Takotsubo cardiomyopathy)
- Mahinang puso sa panahon o pagkatapos ng pagbubuntis (peripartum cardiomyopathy)



**Maaring hindi gaanong
pamilyar ang mga ilang health
providers sa mga pagkakaiba
sa pagitan ng mga kababaihan
at kalalakihan.**



Maaaring nasa mas malaking panganib ang mga babae na magkaroon ng sakit sa puso.

Ang mga sumusunod na kondisyon ay dumadagdag sa panganib na magkaroon ng sakit sa puso:

- Ilang mga komplikasyon ng pagbubuntis
- Maagang menopause (bago ang edad na 45)
- Mga cyst sa mga obaryo at hormonal imbalance (polycystic ovarian syndrome)
- Inflammatory at autoimmune disorders (hal. rheumatoid arthritis, lupus)
- Paninigarilyo
- Diabetes

Lahat tayo ay may magagawa upang mabawasan ang panganib ng sakit sa puso.

Ito ang maaari mong gawin:

- Maging aktibo, patuloy na gumalaw
- Kumain ng iba't ibang masustansyang pagkain
- I-manage ang stress
- Iwasan ang sigarilyo at vape
- Limitahan ang pag-inom ng alak
- Regular na magpatingin sa doktor (pagsusuri para sa asukal sa dugo, presyon ng dugo, at kolesterol)



UPANG MAALAGAN NINYO ANG IBA, KAILANGAN NINYONG ALAGAN ANG INYONG SARILI MUNA.

SIMULAN ANG PAG-UUSAP.

Para suportahan at matuto pa tungkol sa kalusugan ng puso ng kababaihan, mga sintomas, sanhi, panganib, at kung ano ang maaari mong gawin, bumisita sa [WearRedCanada.ca](https://www.WearRedCanada.ca) o makipag-usap sa iyong healthcare provider.



SAKIT SA PUSO NG KABABAIHAN

ALAM MO BA?



[WEARREDCANADA.CA](https://www.WearRedCanada.ca) | @CWHHALLIANCE
#HERHEARTMATTERS



CANADIAN WOMEN'S
HEART HEALTH CENTRE

NATIONAL
ALLIANCE



HER HEART MATTERS
WEAR RED CANADA • FEB 13